



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

**Comissão de Protocolos de Enfermagem na Atenção Básica/Primária**  
Portaria Coren-RS n.º 336/2020

ERRATA

No Protocolo de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde - Saúde da Criança e do Adolescente (COREN-RS, 2020), página 65, quadro 21, coluna condutas/ intervenções de enfermagem, linhas 7 e 8 - “Anti-histamínico HI oral Loratadina”:

Onde se lê: “Crianças entre 2 e 12 anos – abaixo de 30kg: 5ml (5mg) ou 1 comprimido, 1x ao dia, de 7 a 10 dias, enquanto durarem os sintomas”;

Leia-se: “Crianças entre 2 e 12 anos – abaixo de 30kg: 5ml (5mg), 1x ao dia, de 7 a 10 dias, enquanto durarem os sintomas”.

De acordo com a ANVISA, o uso de Loratadina comprimido está indicado apenas para adultos e crianças acima de 12 anos ou com peso corporal acima de 30 kg.

Logo, a posologia indicada é:

**Adultos e crianças acima de 12 anos:** 10 mL de loratadina (10 mg) uma vez por dia. Não administrar mais de 10 mL em 24 horas.

**Crianças de 2 a 12 anos: Peso corporal abaixo de 30 Kg:** 5 mL (5 mg) de loratadina uma vez por dia. Não administrar mais de 5 mL em 24 horas.

**Peso corporal acima de 30 Kg:** 10 mL (10 mg) de loratadina uma vez por dia. Não administrar mais de 10 mL em 24 horas.

Porto Alegre, 23 de abril de 2021.

Thais Mirapalheta Longaray  
COREN-RS 152.625 - ENF

Fábio Meller da Motta  
COREN-RS 129.510 - ENF

Pâmela Leites de Souza Steffen  
COREN-RS 285.667 - ENF

Janilce Dorneles de Quadros  
COREN-RS 350.203 - ENF

Tainá Nicola  
COREN-RS 218.641 - ENF

Vanessa Romeu Ribeiro  
COREN-RS 122.366 - ENF

Carlice Maria Scherer  
COREN-RS 100.967 - ENF